



ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ



ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΙΠΛΟΚΩΝ & ΣΥΜΠΛΟΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

12-13/05/2023

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ GOLDEN AGE

ΟΡΓΑΝΩΣΗ:

Ομάδα Εργασίας Αιμοδυναμικής και Επεμβατικής Καρδιολογίας
Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας



91% Overall Radiation Reduction

Protection for the entire Cath Lab Team




Compromising on Radiation Protection is not an Option

There has not been a radiation protection approach that protects the entire cath lab team.

Any radiation protection solution needs to block scatter radiation below the table, at the head and side.

70%

Of Scatter Radiation comes from below the table




Protection needs to be developed to account for additional staff locations around the table.

Theracor[®]
bisoprolol fumarate

Theracor plus[®]
bisoprolol fumarate + hydrochlorothiazide

Αλλάζουμε συνήθειες
στη διαχείριση της
Καρδιαγγειακής Νόσου



Pharmaceutical Laboratories S.A.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: THERACOR 5 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία. THERACOR PLUS (10+25) mg, επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία. **2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:** THERACOR: Κάθε δισκίο περιέχει 5 mg φαρμακική βισοπρολόλη. THERACOR PLUS (10+25) mg: 1 επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει 10 mg φαρμακικής βισοπρολόλης και 25 mg υδροχλωροθειαζίδης. **3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ:** Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο. **4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:** **Θεραπευτικές ενδείξεις:** THERACOR: Θεραπεία χρόνιου σταθερού καρδιακού ανεπάρκειας με μειωμένη συστολική λειτουργία της αριστερής κοιλίας ως συμπόληση θεραπείας με ανασταλείς που μετατρέπεται ενόψει της συγγενούς και διαμετρικής, και προαιρετικά καρδιακής γλυκοσίδης. THERACOR PLUS: Ιδιαίτερη γρήγορη, αποτελεσματική και ήπια χορήγηση. Τα δισκία πρέπει να λαμβάνονται το πρωί και μπορούν να λαμβάνονται με τροφή. THERACOR: Η μέγιστη συνιστώμενη ημερήσια δόση είναι 10 mg βισοπρολόλης. THERACOR PLUS: Συνίσταται η σταδιακή titroadjusting της δόσης με την κάθε ουσία ξεχωριστά. **Αντενδείξεις:** Οξεία καρδιακή ανεπάρκεια ή κατά τη διάρκεια επείγουσας μη αναστρέψιμης καρδιακής ανεπάρκειας που απαιτούν ενδοφλέβια ενόργανη θεραπεία. Καρδιογενές απόστημα (abscess). **Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση:** Πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή σε: βρογχόσπασμο (βρογχική δόξα, αποφρακτική πνευμονοπάθεια), σακχαρώδη διαβήτη που εμφανίζει μεγάλες διακυμάνσεις στις τιμές γλυκόζης αίματος. **Ανεπιθύμητες ενέργειες:** Bradycardia, ζάλη, κεφαλαλγία, επιδεινωσή, καρδιακές ανεπάρκειες, ναυτία, έμετος, διάρροια, δυσκοιλιότητα, εξασθένιση, ορθοστατική υπόταση, μυϊκή αδυναμία, μυϊκές κράμπες.

THERACOR: Α.Τ. 3.35 €. THERACOR PLUS (10+25) mg: Α.Τ. 4.62 €.

Βεβαιώστε να είναι το φάρμακο που αγοράζετε και
Αναγνώστε GAZE τις ανεπιθύμητες ενέργειες για όλα τα φάρμακα.
Συμπληρώστε την "ΚΑΡΤΑ ΚΑΡΤΕ"



Intravascular Lithotripsy for Cardiovascular Calcium



Your Sound Calcium Strategy.

MediVibe 
member of  SOFMEDICA
LIFE SAVING INNOVATION

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Διεξάγεται και φέτος στην Αθήνα Επιστημονική εκδήλωση με θέμα τις επιπλοκές, στο Golden Age hotel, 12 και 13 Μαΐου. Διοργανώνεται από την Ομάδα Αιμοδυναμικής και Επεμβατικής Καρδιολογίας της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας. Αποτελεί συνέχεια αντίστοιχων εκδηλώσεων προηγούμενων ετών. Εφέτος επεκτείνεται χρονικά, γίνεται Διημερίδα και περιλαμβάνει πέραν των επιπλοκών, επεμβάσεις σύμπλοκες και σπάνιες.

Θα επιδειχθούν τεχνικές και νέα υλικά που θα βοηθήσουν τον Επεμβατικό Καρδιολόγο στο έργο του. Ο μεγάλος αριθμός επιπλοκών, κάποιες με όχι καλή έκβαση, σε όλο το φάσμα των επεμβάσεων, δομικών τε και στεφανιαίων, θα δώσει την ευκαιρία για ανάλυση και εποικοδομητική συζήτηση.

Οι Πρόεδροι και οι Σχολιαστές θα έχουν έγκαιρα ενημερωθεί για τα περιστατικά της συνεδρίας των, ώστε να κατευθύνουν καλύτερα την συζήτηση και να σχολιάσουν αντίστοιχα, ενώ είναι απαραίτητη η δια ζώσης παρουσία των.

«Οι επιπλοκές είναι αναπόσπαστο στοιχείο των ιατρικών πράξεων, ιδιαίτερα χειρουργικών-επεμβατικών. Ο στόχος και η φροντίδα των Ιατρών είναι να τις προλάβουν, αν συμβούν να τις αντιμετωπίσουν και τέλος να τις εκθέσουν αυτούσιες στην κοινότητα. Διότι ο ασφαλέστερος τρόπος για να μάθεις είναι τα σφάλματα και οι επιπλοκές. Βεβαίως δεν χρειάζεται να κάνεις ο ίδιος όλες τις επιπλοκές για να μάθεις. Μάθε και από τα λάθη των άλλων».

Την παραπάνω αντίληψη ευελπιστώ ότι υπηρετεί η παρούσα εκδήλωση. Απώτερος σκοπός της είναι να συμβάλλει στην μείωση των επιπλοκών άλλα και στην αύξηση της ασφάλειας και της επιτυχίας των σύμπλοκων επεμβατικών πράξεων.

Γεώργιος Κοχιαδάκης
Πρόεδρος
Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας

Γεώργιος Τριάντης
Πρόεδρος
Ομάδας Αιμοδυναμικής
& Επεμβατικής Καρδιολογίας



Παρασκευή 12 Μαΐου

14.15-14.30 Σύντομοι Χαιρετισμοί
Κοκιαδάκης Γεώργιος, Πρόεδρος ΕΚΕ
Τριάντης Γεώργιος, Πρόεδρος Ομάδος Επεμβατικής Καρδιολογίας ΕΚΕ

14.30-16.00 ΣΥΝΕΔΡΙΑ 1
Πρόεδροι: **Κανακάκης Ι., Καυκάς Ν.**
Σχολιαστές: **Σάσσαλος Κ., Κουτουλάκης Μ.**
Πατσιλινάκος Σ. Αυτόματος διαχωρισμός στεφανιαίων αρτηριών σε γυναίκα στον 4ο μήνα της λοχείας
Νικίτας Γ. Περικαρδική συλλογή μετά θρομβόλυση και πρωτογενή PCI
Καράλης Ι. Κατέρρευση ασθενούς κατά την διάρκεια διάνοιξης CTO
Δρη Ε. Διαχωρισμός βραχιονίου αρτηρίας πλησίον παλαιού stent
Καραμπίνος Η. Στομιακός διαχωρισμός RCA σε NONSTEMI PCI

16.00-17.00 ΣΥΝΕΔΡΙΑ 2
Πρόεδροι: **Μιχάλης Λ., Τσιαφούτης Ι.**
Σχολιαστές: **Μαμαρέλης Ι., Τριανταφύλλου Κ.**
Πλατογιάννης Ν. Παραμόρφωση stent από παγιδευμένο σύρμα
Βούδρης Β. Μετακίνηση αυτοεκτεινόμενης βαλβίδος στην αριστερά κοιλία
Χαμπλός Μ. Μετακίνηση συσκευής σύγκλεισης PFO
Κασίμης Γ. Διαχωρισμός non-culprit lesion σε πρωτογενή αγγειοπλαστική σε ασθενή με σύνδρομο Turner

17.00-17.30 Διάλειμμα

17.30-19.00 ΣΥΝΕΔΡΙΑ 3
Πρόεδροι: **Ολύμπιος Χ., Χάχαλης Γ.**
Σχολιαστές: **Ρούτουλας Θ., Στουγιάννος Π.**
Τσίγκας Γ. Distal access σε πρωτογενή PCI και καρδιογενές shock
Μίλκας Α. Αντιμετώπιση στομιακής επαναστένωσης μέσα από stent με μεγάλη πρόπτωση στην αορτή
Ραϊσάκης Κ. Οξεία θρόμβωση stent μετά από Πρωτογενή Αγγειοπλαστική-Kounis Syndrome
Καρτάλης Α. Το ταξίδι απωλεσθέντος stent
Πουλιδάκης Ε. Rotatrap και DK Crush σε διχασμό στελέχους Ι.
Τσιούφης Κ. Ταυτόχρονες οξείες αποφράξεις και επείγουσες αγγειοπλαστικές σε στεφανιαία και περιφερική αρτηρία



19.00-20.30	ΣΥΝΕΔΡΙΑ 4
	Πρόεδροι: Ανδρουλάκης Α., Τρίκας Α.
	Σχολιαστές: Μπουρμπούλης Ν., Καούκης Α.
	Τριανταφύλλης Α. Περικαρδιακή συλλογή από διάτρηση φλεβικού μοσχεύματος σε PCI μέσω LIMA
	Τσιαφούτης Ι. Διενέργεια PCI μέσω λίαν ελικοειδούς LIMA
	Ροδίτης Π. Ολική επαναιμάτωση με σύμπλοκη PCI σε ασθενή με NONSTEMI και Covid
	Τζώρτζης Σ. Η μη συμμόρφωση του ασθενούς ακυρώνει και το καλύτερο αποτέλεσμα
20.30-21.00	Σαμαράς Α. Υπεροξεία θρόμβωση stent στην περισπωμένη. Επακόλουθη θρόμβωση σε LM και LAD
	Workshop: When Engineering Meets Complex Anatomy
	Microcatheters Simulation Zone
	Με τη ευγενική χορηγία της Teleflex®



Σάββατο 13 Μαΐου

09.00-10.30	ΣΥΝΕΔΡΙΑ 5
Πρόεδροι:	Τζιακάς Δ., Δαγρέ Α.
Σχολιαστές:	Αβραμίδης Δ., Αχτύπης Δ.
Μπούνας Π.	Διαχωρισμός του donor vessel, αποκατάσταση και επαναθρόμβωση
Παπουτσής Δ.	Καθυστερημένη εξαγγείωση και επιπωματισμός μετά PCI σε έντονα ασβεστωμένη βλάβη
Τσόρλαλης Ι.	Επιπλοκή σε ασθενή με ιδιοπαθή θρομβοκυττάρωση στην διάρκεια πρωτογενούς PCI
Μόσιαλος Λ.	Αντιμετώπιση Νόσου στελέχους σε διασωληνωμένο ασθενή με STEMI και σύγχρονη διενέργεια ΚΑΡΠΑ
Παπακωνσταντίνου Ν.	Διάτρηση στεφανιαίου αγγείου από burr rotablator
Μαντής Χ.	Απόφραξη donor vessel κατά την προσπάθεια διάνοιξης CTO

10.30-11.00 Διάλειμμα

11.00-12.30	ΣΥΝΕΔΡΙΑ 6
Πρόεδροι:	Βαβουρανάκης Ε., Σκαλίδης Ε.
Σχολιαστές:	Ηλιόπουλος Δ., Νίκας Δ.
Λαμπρόπουλος Κ.	Ολίσθηση της βαλβίδος στην αορτή
Καλογεράς Κ.	Διαδερμική αντιμετώπιση παραβαλβιδικής διαφυγής στην μιτροειδή
Λάτσιος Γ.	Οξεία ανεπάρκεια αορτής κατά την TAVI
Τάλεμπ Α.	Υβριδική αντιμετώπιση στεφανιαίας νόσου και στενώσεως αορτής
Δημητριάδης Κ.	EER μιτροειδούς με συσκευή MitraClip σε έκδηλα ρικνή και ασβεστωμένη οπίσθια μιτροειδική γλωχίνα
Μαστροκωστόπουλος Α.	Οξεία απόφραξη κοινής μηριαίας αρτηρίας μετά την ολοκλήρωση της TAVI
Τζιακάς Δ.	Ολίσθηση βαλβίδος στην αορτή (εκπυσσόμενη με μπαλόνι)

12.30-14.00	ΣΥΝΕΔΡΙΑ 7
Πρόεδροι:	Κατσούρας Χ., Μπομπότης Γ.
Σχολιαστές:	Παππάς Χ., Αλμπάνης Γ.
Καρυοφύλλης Π.	Αγγειοπλαστική πνευμονικών αρτηριών
Μανουσόπουλος Κ.	Πρώτη χρήση νέας συσκευής περιστροφικής αθηρεκτομής
Τζάνης Γ.	Νέα διαδερμική παρέμβαση για σταθερή στηθάγχη που δεν ελέγχεται με φάρμακα και δεν επιδέχεται επαναγγείωσης
Καντζής Ι.	Αντιμετώπιση βλάβης διχασμού με σύγχρονα υλικά
Παπαναγιώτου Π.	Αντιμετώπιση αιμορραγίας με χρήση coils. Οι απαραίτητες γνώσεις που πρέπει να έχει ο καρδιολόγος
Τσαναξίδης Π.	Αντιμετώπιση περιφερικής εξαγγείωσης με τοποθέτηση coils

ΟΡΓΑΝΩΣΗ: Ομάδα Εργασίας Αιμοδυναμικής και Επεμβατικής Καρδιολογίας Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας

14.00-15.00	Διάλειμμα
15.00-16.15	ΣΥΝΕΔΡΙΑ 8 Πρόεδροι: Ιακώβου Ι., Ζαρίφης Ι. Σχολιαστές: Κατσιμαγκλής Γ., Ζαχαρούλης Α. Τούτουζας Κ. Διαδερμική αντικατάσταση πνευμονικής Βαλβίδος Νινιός Β. Διαδερμική αντικατάσταση μιτροειδούς βαλβίδος Αζναουρίδης Κ. Εμφύτευση βιοπροσθετικής βαλβίδας στη θέση της τριγλώχινας Valve-in-Valve Νινιός Β. Υπολειπόμενη μεσοκοιλιακή επικοινωνία μετά από transseptal Μεζίλης Ν. Αντενδείξεις Rotablator: όλα είναι σχετικά!
16.15-17.30	ΣΥΝΕΔΡΙΑ 9 Πρόεδροι: Μαγγίνας Α., Πουλημένος Λ. Σχολιαστές: Δαμάσκος Δ., Σανίδας Η. Μπούκη Κ. Απρόσμενη επιπλοκή κατά την προσπάθεια διάνοιξης CTO Σαμαράς Α. Διαχωρισμός αορτής κατά την διάρκεια αγγειοπλαστικής διάσωσης Νικολαΐδου Σ. Ο ρόλος του νοσηλευτού στην πρόληψη επιπλοκών στο αιμοδυναμικό εργαστήριο Ζιάκας Α. Παλινδρομος διαχωρισμός στελέχους και ανιούσης αορτής Ιωαννίδης Ε. Διάτρηση της εν τω βάθει κάτω επιγαστρικής αρτηρίας κατά την προετοιμασία για αγγειοπλαστική καρωτίδος
17.30-18.00	Διάλειμμα
18.00-19.30	ΣΥΝΕΔΡΙΑ 10 Θεραπεύοντας τις αστοχίες των άλλων. Κοινό τραπέζι καρδιολόγων-καρδιοχειρουργών Πρόεδροι: Αλεξόπουλος Δ., Παττακός Ε., Μάκος Γ. Σχολιαστές: Πράπας Σ., Αρώνη Μ., Σιώνης Δ., Φούσας Σ., Μιχάλης Λ. Ομιλητές: Κωτούλας Χ., Γαβριελάτος Γ., Κοκοτσάκης Ι., Καρανικόλας Ν., Δημόπουλος Α.

EXPERIENCE... THE DIFFERENCE.

Introducing Perclose™ ProStyle™—our next-generation Suture-Mediated Closure and Repair System, advancing the proven, trusted legacy of Perclose ProGlide™.



Designed with high tensile strength
needles for increased reliability
and performance¹



A secure close
minimizing access
site-related complications^{2,3,4}



An enhanced patient
experience, enabling
same-day discharge⁵



NOW CE MARKED

Visit PercloseProStyle.com/int to learn more.

1. Data on file at Abbott. 2. Perclose™ ProStyle™ SMCR System - Instructions for Use. 3. The Use of the Perclose ProGlide™ Suture Mediated Closure (SMC) Device for Venous Access-Site Closure up to 24F Sheaths. Kar, Saibal; Hermiller, James; et al. CRT 2018. 4. Schneider DB, Zvonimir K et al. Clinical and economic outcomes of ProGlide compared with surgical repair of large bore arterial access. *J. Comp. Eff. Res.* (2019) 8(16), 1381-1392. 5. Verma, S., et al, Feasibility and Safety of Same Day Discharge for Patients Undergoing Atrial Fibrillation (AF) Ablation in a Community Hospital Setting. HRS 2020 Science Online, May 2020.

CAUTION: This product is intended for use by or under the direction of a physician. Prior to use, reference the Instructions for Use, inside the product carton (when available) or at vascular.eifu.abbott or at medical.abbott/manuals for more detailed information on Indications, Contraindications, Warnings, Precautions and Adverse Events. This material is intended for use with healthcare professionals only.

Information contained herein for DISTRIBUTION outside the U.S. ONLY. Check the regulatory status of the device in areas where CE marking is not the regulation in force.

Illustrations are artist's representations only and should not be considered as engineering drawings or photographs.

Abbott International BVBA

Park Lane, Culliganlaan 2B, 1831 Diegem, Belgium, Tel: 32.2.714.14.11

™ Indicates a trademark of the Abbott Group of Companies.

www.cardiovascular.abbott

©2021 Abbott. All rights reserved. MAT-2104413 v1.0





Carol:
Days post-procedure:
3426 and counting

REACH FOR XIENCE™

BECAUSE YOUR STENT CHOICE LIVES WITH THEM

Life looks different for the 12 million patients worldwide who have been treated with a XIENCE™ Stent.¹

XIENCE™

Everolimus Eluting Coronary Stent System

1. Data on file at Abbott – 12 million patients number is based on data of DES implants through Q2, 2022.

Outcomes may not be representative of all patients. See – Kufner S, et al. *Circulation*. 2019;139:325-333 – for XIENCE™ Stent long term clinical outcomes. Paid model – not actual patient.

CAUTION: This product is intended for use by or under the direction of a physician. Prior to use, reference the Instructions for Use, inside the product carton (when available) or at vascular.eifu.abbott or at medical.abbott/manuals for more detailed information on Indications, Contraindications, Warnings, Precautions and Adverse Events. This material is intended for use with healthcare professionals only.

Information contained herein for DISTRIBUTION outside the U.S. ONLY. Check the regulatory status of the device in areas where CE marking is not the regulation in force.

Photo on file at Abbott.

Abbott International BVBA

Park Lane, Culliganlaan 2B, 1831 Diegem, Belgium, Tel: 32.2.714.14.11

™ Indicates a trademark of the Abbott Group of Companies.

www.cardiovascular.abbott

©2022 Abbott. All rights reserved. MAT-2214212 v1.0





ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ | ΣΧΟΛΙΑΣΤΩΝ | ΟΜΙΛΗΤΩΝ

12

Πρόγραμμα

Αβραμίδης Δημήτριος
Αζναουρίδης Κωνσταντίνος
Αλεξόπουλος Δημήτριος
Αλμπάνης Γεώργιος
Ανδρουλάκης Αριστείδης
Αρώνη Μαρία
Αχτύπης Διονύσιος
Βαβουρανάκης Εμμανουήλ
Βούδρης Βασίλειος
Γαβριελάτος Γεράσιμος
Δαγρέ Άννα
Δαμάσκος Δημήτριος
Δημητριάδης Κυριάκος
Δημόπουλος Αντώνης
Δρη Ειρήνη
Ζαρίφης Ιωάννης
Ζαχαρούλης Αχιλλέας
Ζιάκας Αντώνιος
Ηλιόπουλος Δημήτριος
Ιακώβου Ιωάννης
Ιωαννίδης Εμμανουήλ
Καλογεράς Κωνσταντίνος
Κανακάκης Ιωάννης
Καντζής Ιωάννης
Καούκης Α.
Καράλης Ιωάννης
Καραμπίνας Ηλίας
Καρανικόλας Νικόλαος
Καρτάλης Αθανάσιος
Καρυοφύλλης Παναγιώτης
Κασίμης Γεώργιος
Κατσιμαγκλής Γεώργιος

Κατσούρας Χρήστος
Καυκάς Νικόλαος
Κοκοτσάκης Ιωάννης
Κουτουλάκης Εμμανουήλ
Κοχιαδάκης Γεώργιος
Κωτούλας Χριστόφορος
Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος
Λάτσιος Γιώργος
Μαγγίνας Αθανάσιος
Μάκος Γεώργιος
Μαμαρέλης Ιωάννης
Μανουσόπουλος Κωνσταντίνος
Μαντής Χρήστος
Μαστροκωστόπουλος Αντώνιος
Μεζίλης Νικόλαος
Μίλκας Αναστάσιος
Μιχάλης Λάμπρος
Μόσιαλος Λάμπρος
Μπομπούνης Γεώργιος
Μπούκη Κωνσταντίνα
Μπούνας Παύλος
Μπουρμπούλης Ν.
Νίκας Δημήτριος
Νικήτας Γιώργος
Νικολαΐδου Στέλλα
Νινιός Βλάσης
Ολύμπιος Χριστόφορος
Παπακωνσταντίνου Νικόλαος
Παπαναγιώτου Παναγιώτης
Παπουτσής Δημήτριος
Παππιάς Χρήστος
Πατσιλινάκος Σωτήριος

Παττακός Ευστράτιος
Πλατογιάννης Νίκος
Πουλημένος Λεωνίδας
Πουλιδάκης Εμμανουήλ
Πράπας Σωτήριος
Ραϊσάκης Κωνσταντίνος
Ροδίτης Παύλος
Ρούτουλας Θεόδωρος
Σάσσαλος Κωνσταντίνος
Σαμαράς Αντώνης
Σανίδας Ηλίας
Σιώνης Δημήτριος
Σκαλίδης Εμμανουήλ
Στουγιάννος Παύλος
Τάλεμπ Άνταμ
Τζάνης Γεώργιος
Τζιακας Δημήτριος
Τζωρτζής Σταύρος
Τούτουζας Κωνσταντίνος
Τριανταφύλλης Ανδρέας
Τρίκας Αθανάσιος
Τριάντης Γεώργιος
Τριανταφύλλου Κωνσταντίνος
Τσαναξίδης Νικόλαος
Τσιαφούτης Ιωάννης
Τσίγκας Γρηγόρης
Τσιούφης Κωνσταντίνος
Τσόρλαλης Ιωάννης
Φούσας Στέφανος
Χάχαλης Γεώργιος
Χαμηλός Μιχάλης



BRILIQUE®

ticagrelor



Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται ιατρική συνταγή.
Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει 60 mg ή 90 mg τικαγρελόρης.


Brilique F.C.Tab 60mg/tab Btx60 N.T. 44,11€ / Α.Τ. 64,48€
Brilique F.C.Tab 90mg/tab Btx56 N.T. 48,81€ / Α.Τ. 71,36€

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «**ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ**»

Για τις πλήρεις συνταγογραφικές πληροφορίες απευθυνθείτε στην AstraZeneca ΑΕ ή ανατρέξτε στο
<https://medicalinformation.astrazeneca.gr/home/prescribing-information.html>

AstraZeneca 

Αγησιλάου 6-8, 151 23 Μαρούσι, **Τηλ.:** 210 68 71 500, **Fax:** 210 68 47 968
Τηλ. Παραγγελιών: 216 200 0000, **Fax:** 210 55 96 973, <http://b2b.astrazeneca.gr>



ΠΑΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ

ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

12-13/5
2023

Διημερίδα Επιπλοκών και
Σύμπλοκων Επεμβάσεων

Ξενοδοχείο Golden Age

ΟΡΓΑΝΩΣΗ: Ομάδα Εργασίας Αιμοδυναμικής και Επεμβατικής Καρδιολογίας Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας

ΧΟΡΗΓΟΙ



Abbott



Bayer



Boehringer
Ingelheim

Boston
Scientific



Μ.Σ. Ιακωβίδης Ελλάς



SIEMENS

Teleflex®



Pharmaceutical Laboratories S.A.



ΠΑΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ
ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ

15

Πρόγραμμα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τόπος Διεξαγωγής: Golden Age Hotel, Μιχαλακοπούλου 57, 115 28, Αθήνα

Ιστοσελίδα Διημερίδας: <https://complications2023.frei.gr/>

Επικοινωνία: Email: complications2023@frei.gr

16

Πρόγραμμα

Οργάνωση



Επιστημονική Εταιρεία

Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία

Ηλία Ποταμιάνου 6, 115 28, Αθήνα

<https://www.hcs.gr/>

T: 2107221633, 2107258003, 2107258004, 2107258006

F: 2107226139

E: info@hcs.gr

Εταιρεία Οργάνωσης



FREI A.E.

Congress Organiser – Virtual Events – Corp. Meetings/Events – DMC

Paparrigopoulou 3, 105 61 Athens

T: +30 210 3215600, F: +30 210 3219296

www.frei.gr • E: info@frei.gr, complications2023@frei.gr



Διημερίδα Επιλοκών και Σύμπλοκων Επεμβάσεων

Ξενοδοχείο Golden Age

ΟΡΓΑΝΩΣΗ: Ομάδα Εργασίας Αιμοδυναμικής και Επεμβατικής Καρδιολογίας Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας


ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

17

Πρόγραμμα



ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ



RAIN SHEATH™ TRANSRADIAL THIN-WALLED INTRODUCER

NEXT GENERATION THIN-WALLED SHEATH
DESIGNED FOR CONSISTENT PERFORMANCE IN RADIAL CASES



PROPRIETARY KINK RECOVERY TECHNOLOGY™

Elastomeric properties
allow the RAIN Sheath™
Introducer to bend and flex
to maintain lumen integrity



IN-VESSEL STABILITY

1 cm non-slip secure
zone at proximal end of
sheath designed to secure
placement after insertion



HEXACUSPID HEMOSTASIS VALVE

Designed to preserve
hemostasis and
reduce risk of bleedback



LUBRICIOUS HYDROPHILIC COATING

Facilitates smoother, easier
insertion and removal



1357 ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΣΤΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΠΠΟΥ

ΧΑΡΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΟΥ ΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΕ ΣΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ
ΣΑΣ ΜΕ ΚΟΛΠΙΚΗ ΜΑΡΜΑΡΥΓΗ¹

1. Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Xarelto®

https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/xarelto-epar-productinformation_el.pdf



Bayer

Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας:
Bayer AG, 51368 Leverkusen, Γερμανία.
Τοπικός αντιπρόσωπος του κατόχου άδειας
κυκλοφορίας στην Ελλάδα: Bayer Ελλάς
ABEE, Σωρού 18-20, 151 25 Μαρούσι.
Τοπικός αντιπρόσωπος του κατόχου άδειας
κυκλοφορίας στην Κύπρο: Novagem Ltd,
Τηλ: 00357 22483858.

Τμήμα Επιστημονικής Ενημέρωσης
Τηλ: +30 210 6187742, Fax: +30 210 6187522
Email: medinfo.gr.cy@bayer.com
Αρ. ΓΕΜΗ 000299101000

Εταιρεία συμπτώθησης



ELPEN Α.Ε. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Λεωφ. Μαραθώνος 95, 190 09 Πικέριμι Αττικής,
Τηλ: 210 6039326 - 9, Fax: 210 6039300
ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
Σεβαστείας 11, 115 28 Αθήνα,
Τηλ: 210 7488711, Fax: 210 7488731
Εθν. Αντιστάσεως 114, 551 34 Θεσσαλονίκη,
Τηλ: 2310 459920 - 1, Fax: 2310 459269
Αρ. ΓΕΜΗ 000264601000



Xarelto®
rivaroxaban

Χορηγείται με ιατρική συνταγή

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»



Για την πλήρη Περίληψη
Χαρακτηριστικών
Προϊόντος (ΠΧΠ)
σαρώστε εδώ